

Ausdruck vom: Donnerstag, 28. Februar 2013 11:39:07

PC-Name: SYSTEM1

Benutzername: Administrator

The screenshot shows a Windows Internet Explorer browser window. The address bar displays the URL <http://private-frauenarztpraxis.de/operationen/>. The browser's menu bar includes 'Datei', 'Bearbeiten', 'Ansicht', 'Favoriten', 'Extras', and '?'. A single tab is open, titled 'Operationen | Private Frauenarztpraxis - Dr. Leistens...'. The main content area is divided into two columns. The left column contains text about pregnancy termination, including sections for 'Schwangerschaftsabbruch', 'Medikamentöser Schwangerschaftsabbruch', and 'Operativer Schwangerschaftsabbruch'. The right column features a dark red header with the text 'vereinbaren Sie einen Termin' and a phone icon next to the number '030 / 565 930 25'. Below this is an orange button labeled 'ODER'. The form contains several input fields: 'Full Name', 'Phone Number', 'Email Address', and 'Appointment Date'. There is also a larger text area for a 'Message'. At the bottom of the form, there is a logo for 'jrZXO' and an orange button labeled 'Anfrage senden'.

**Schwangerschaftsabbruch**

Sie benötigen eine Feststellung der Schwangerschaft durch den Arzt und eine schriftliche Bescheinigung über eine Beratung bei einer nach § 219 StGB anerkannten Beratungsstelle und Ihre Blutgruppe.  
Es muss eine Bedenkzeit von mindestens 3 Tagen zwischen Beratung und Schwangerschaftsabbruch eingehalten werden.

**Medikamentöser Schwangerschaftsabbruch**

Der Schwangerschaftsabbruch mit Tabletten (Mifegyne) wird bei uns bis zum 49. Tag (7. Woche), gerechnet vom ersten Tag der letzten Regelblutung, durchgeführt.  
Der Abbruch erfolgt in zwei Schritten:

- 1. Einnahme von 3 Tabletten Mifegyne und
- 2. Einnahme von 2 Tabletten Cytotec 48 Stunden später

Blutungen treten in seltenen Fällen bereits nach der ersten Medikamenteneinnahme, jedoch sicher nach der zweiten Gabe ein. Diese Blutung kann stärker sein als eine normale Regel, da hiermit die Schwangerschaft ausgestoßen wird. Nach ca. einer Woche muss eine Kontrolluntersuchung vorgenommen werden, ob der Fruchtsack vollständig ausgestoßen wurde.  
In ca. 1 bis 4 % der Fälle versagt die Methode, und es wird eine chirurgische Beendigung des Abbruchs notwendig.

**Operativer Schwangerschaftsabbruch**

Der operative Abbruch wird bis zur vollendeten 12. Schwangerschaftswoche in Narkose durchgeführt. Um einen besseren Zugang zur Gebärmutterhöhle zu schaffen, wird der Gebärmutterhals mit stumpfen Metallstiften aufgedehnt. Die Schwangerschaft wird dann mit Hilfe eines Absauggerätes und eines löffelförmigen Instrumentes (Kürette) ausgeschabt.  
Ich kontrolliere noch im OP mit Hilfe eines Ultraschallgerätes die vollständige Entfernung des Schwangerschaftsmaterials.  
Über mögliche Risiken und Komplikationen informiere ich Sie gerne persönlich.

**vereinbaren Sie einen Termin**

030 / 565 930 25

ODER

Full Name

Phone Number

Email Address

Appointment Date

Message

jrZXO

Anfrage senden